

尤旋卓®
普盧利沙星片



【藥品名稱】

通用名稱：普盧利沙星片

商品名稱：尤旋卓®

【適應症】用於治療對普盧利沙星活性主體 (Ulfloxacin) 敏感的金黃色葡萄球菌 (僅對甲氧西林敏感型分離株)、表皮葡萄球菌 (僅對甲氧西林敏感型分離株)、肺炎鏈球菌、化膿性鏈球菌、大腸埃希菌、流感嗜血桿菌、肺炎桿菌、黏膜炎莫拉菌、奇異變形桿菌、普通變形桿菌、銅綠假單胞菌引起的下列感染：

1. 急性單純性下尿路感染 (單純性膀胱炎)
2. 複雜性下尿路感染
3. 慢性支氣管炎急性發作
4. 急性細菌性鼻竇炎

由於使用氟喹諾酮類藥物 (包括普盧利沙星片) 已有報導發生嚴重不良反應，且對於一些患者，急性單純性下尿路感染 (單純性膀胱炎) /慢性支氣管炎急性發作/急性細菌性鼻竇炎有自限性，應在沒有其他治療藥物治療時方可使用普盧利沙星片。

應按照呼吸道感染治療的有關國家或地方指南對急性細菌性鼻竇炎進行充分診斷。對於細菌性鼻竇炎的治療，本品僅用於症狀持續時間少於 4 周的患者。

應在感染性疾病患者的治療中考慮到局部抗生素敏感性。

【用法用量】

本品應整片吞服。不應與牛奶或乳製品同服。

本品僅供成人使用，推薦劑量為：

- 急性單純性下尿路感染（單純性膀胱炎）：僅一次性給藥 600mg（一片）。
- 複雜性下尿路感染：每日一次，每次 600mg(一片)，治療最多不超過 10 日。
- 慢性支氣管炎急性發作：每日一次，每次 600mg(一片)，治療最多不超過 10 日。
- 急性細菌性鼻竇炎：每日一次，每次 600mg(一片)，治療最多不超過 10 日。

複雜性下尿路感染和慢性支氣管炎急性發作的治療持續時間取決於疾病的嚴重程度和患者的臨床療效，治療必須要持續至症狀減輕或痊癒後 48-72 小時。

【包裝規格】 600mg 每片，鋁泡罩，5 片/每盒