

納治良®
鹽酸丙卡巴肼膠囊



【藥品名稱】

通用名稱：鹽酸丙卡巴肼膠囊


英文名稱：Procarbazine Hydrochloride Capsules

漢語拼音：Yansuan Bingkabajing Jiaonang

【成份】 本品主要成份為鹽酸丙卡巴肼。

化學名稱：N-(1-甲基乙基)-4-[(2-甲基胍基)-甲基]苯甲醯胺鹽酸鹽

化學結構式：



分子式：C₁₂H₁₉N₃O·HCl

分子量：257.76

輔料：甘露醇、玉米澱粉、滑石粉、硬脂酸鎂、明膠空心膠囊。

【性狀】 本品為硬膠囊，內容物為白色至淡黃色細微顆粒狀粉末。

【適應症】 本品適用於成人霍奇金淋巴瘤的聯合化療。

【規格】 50mg (按 C₁₂H₁₉N₃O 計)

【用法用量】

用法

本品可與餐食一起服用或在兩餐之間服用。

應整顆膠囊吞服，不得咀嚼。如果患者有嚴重的吞嚥困難，可將膠囊內容物與糖漿或稀粥混合服用。

本品只能由接受過充份內科腫瘤學或血液學培訓的醫生開處方使用，在治療期間必須進行周密的醫療護理。第一階段的治療最好在有細胞抑制治療經驗的醫院進行。如果出現任何不良反應，必須立即通知醫生。

用量

本品與其他細胞抑制劑聯合使用，成人每天口服劑量為 $100\text{mg}/\text{m}^2$ ，服用 7-14 天。

治療劑量和持續時間取決於以下因素（參見【臨床試驗】）：

- 所用的化療方案；
- 骨髓功能當前的狀態（監測外周血中的中性粒細胞和血小板）；
- 骨髓儲備（累積的化療預處理，先前的放射治療）；
- 在與其他細胞抑制劑聯合治療的範圍內預期的骨髓抑制作用；
- 可以合併使用保肝、保護心臟以及預防嘔吐等藥物。