

曲特恪®  
盐酸曲唑酮缓释片



【药品名称】

通用名称：盐酸曲唑酮缓释片

商品名称：TRITTICO®

英文名称：Trazodone Hydrochloride Sustained-release Tablets


汉语拼音：Yansuan Quzuotong Huanshi Pian

【成份】

本品活性成份为盐酸曲唑酮。

化学名称：2-[3-[4-(3-氯苯基)-1-哌嗪基]丙基]-1,2,4-三唑并[4,3- $\alpha$ ]吡啶-3(2H)-酮盐酸盐

化学结构式：



分子式：C<sub>19</sub>H<sub>22</sub>ClN<sub>5</sub>O·HCl

分子量：408.33

辅料：蔗糖、聚维酮、巴西棕榈蜡、硬脂酸镁

【性状】

本品为白色至黄白色长条形片，片面两侧各有两条刻痕。

【适应症】

用于伴有或不伴有焦虑症状的抑郁症。

【规格】

(1) 75mg; (2) 150mg

### 【用法用量】

本品仅供成人使用。

治疗应在晚间开始用药，并逐渐增加日剂量。本品用药周期应至少为一个月。

餐后用药可降低不良反应（增加再吸收并降低血浆峰浓度）。

本刻痕片可分为三部分，以便根据患者的疾病严重程度、体重、年龄和一般情况逐步增加剂量。

#### 成人：

每日晚间临睡前一次性服用 75-150mg。

每日最高剂量可增加至 450mg，分两次服用。

住院患者（即较严重的抑郁症患者）每日剂量可以高达但不能超过 600mg，分次服用。

#### 老年患者：

对于年迈或体弱患者，推荐的起始剂量应减少至每日 100mg，可分次服用或晚间单次服用。可根据耐受性和疗效在监督下逐渐增加剂量。一般而言，这些患者的单次剂量不得超过 100mg。每日剂量一般不得超过 300mg。

#### 儿童：

由于缺乏安全性数据，儿童和 18 岁以下青少年不得使用本品。