

尤旋卓®
普卢利沙星片



【药品名称】

通用名称：普卢利沙星片

商品名称：尤旋卓®

【适应症】 用于治疗对普卢利沙星活性主体（Ulifloxacin）敏感的金黄色葡萄球菌（仅对甲氧西林敏感型分离株）、表皮葡萄球菌（仅对甲氧西林敏感型分离株）、肺炎链球菌、化脓性链球菌、大肠埃希菌、流感嗜血杆菌、肺炎杆菌、黏膜炎莫拉菌、奇异变形杆菌、普通变形杆菌、铜绿假单胞菌引起的下列感染：

1. 急性单纯性下尿路感染（单纯性膀胱炎）
2. 复杂性下尿路感染
3. 慢性支气管炎急性发作
4. 急性细菌性鼻窦炎

由于使用氟喹诺酮类药物（包括普卢利沙星片）已有报道发生严重不良反应，且对于一些患者，急性单纯性下尿路感染（单纯性膀胱炎）/慢性支气管炎急性发作/急性细菌性鼻窦炎有自限性，应在没有其他治疗药物治疗时方可使用普卢利沙星片。

应按照呼吸道感染治疗的有关国家或地方指南对急性细菌性鼻窦炎进行充分诊断。对于细菌性鼻窦炎的治疗，本品仅用于症状持续时间少于4周的患者。

应在感染性疾病患者的治疗中考虑到局部抗生素敏感性。

【用法用量】

本品应整片吞服。不应与牛奶或乳制品同服。

本品仅供成人使用，推荐剂量为：

- 急性单纯性下尿路感染（单纯性膀胱炎）：仅一次性给药 600mg（一片）。
- 复杂性下尿路感染：每日一次，每次 600mg(一片)，治疗最多不超过 10 日。
- 慢性支气管炎急性发作：每日一次，每次 600mg(一片)，治疗最多不超过 10 日。
- 急性细菌性鼻窦炎：每日一次，每次 600mg(一片)，治疗最多不超过 10 日。

复杂性下尿路感染和慢性支气管炎急性发作的治疗持续时间取决于疾病的严重程度和患者的临床疗效，治疗必须要持续至症状减轻或痊愈后 48-72 小时。

【包装规格】 600mg 每片，铝泡罩，5 片/每盒