

曲前列尼爾注射液



【藥品名稱】

通用名稱：曲前列尼爾注射液


英文名稱：Treprostинil Injection

漢語拼音：Quqianlienier Zhusheyeye

【成份】本品主要成份為曲前列尼爾。

化學名稱：[(1R, 2R, 3aS, 9aS)-2, 3, 3a, 4, 9, 9a-六氫-2-羥基-1-[(3S)-3-羥基辛烷基]-1H-苯並[f]茚-5-基]氧基]乙酸

化學結構式：



分子式： $C_{23}H_{34}O_5$

分子量：390.52

輔料：枸櫞酸鈉、鹽酸、間甲酚、氫氧化鈉、氯化鈉、注射用水。

【性狀】本品為無色至微黃色的澄明液體。

【適應症】本品用於治療肺動脈高壓 (PAH, WHO 分類 1)，以減輕運動引起的相關症狀。在建立本品療效的研究中，研究受試者包括 NYHA 功能分級 II ~ IV 級的原發性和遺傳性肺動脈高壓 (58%)、與先天性體肺循環分流相關的肺動脈高壓 (23%) 以及與結締組織疾病相關的肺動脈高壓 (19%)。

【規格】 20ml: 50mg

【用法用量】 本品不需進一步稀釋可直接使用；或者輸注前用無菌注射用水或 0.9%NaCl 注射液稀釋。本品的給藥方式為皮下或靜脈注射給藥。

採用不同稀釋劑稀釋後藥液的儲存與使用期限詳見下表 1。

表 1：不同稀釋劑的選擇

稀釋劑	儲存期限	使用期限
無	與本品有效期相同	40°C 條件下，16 週內用完
無菌注射用水	室溫下可儲存 4 小時	40°C 條件下，48 小時內用完
0.9%NaCl 注射液	冷藏條件下可儲存 24 小時	