

纳治良®

盐酸丙卡巴肼胶囊




#### 【药品名称】

通用名称：盐酸丙卡巴肼胶囊  
英文名称：Procarbazine Hydrochloride Capsules  
汉语拼音：Yansuan Bingkabajing Jiaonang

#### 【成份】

本品主要成份为盐酸丙卡巴肼。  
化学名称：N-(1-甲基乙基)-4-[(2-甲基胍基)-甲基]苯甲酰胺盐酸盐  
化学结构式：



分子式：C<sub>12</sub>H<sub>19</sub>N<sub>3</sub>O·HCl  
分子量：257.76  
辅料：甘露醇、玉米淀粉、滑石粉、硬脂酸镁、明胶空心胶囊。

#### 【性状】

本品为硬胶囊，内容物为白色至淡黄色细微颗粒状粉末。

#### 【适应症】

本品适用于成人霍奇金淋巴瘤的联合化疗。

#### 【规格】

50mg (按C<sub>12</sub>H<sub>19</sub>N<sub>3</sub>O计)

#### 【用法用量】

##### 用法

本品可与餐食一起服用或在两餐之间服用。

应整颗胶囊吞服，不得咀嚼。如果患者有严重的吞咽困难，可将胶囊内容与糖浆或稀粥混合服用。

本品只能由接受过充分内科肿瘤学或血液学培训的医生开处方使用，在治疗期间必须进行周密的医疗护理。第一阶段的治疗最好在有细胞抑制治疗经验的医院进行。如果出现任何不良反应，必须立即通知医生。

##### 用量

本品与其他细胞抑制剂联合使用，成人每天口服剂量为100mg/m<sup>2</sup>，服用7-14天。

治疗剂量和持续时间取决于以下因素(参见【临床试验】)：

- 所用的化疗方案；
- 骨髓功能当前的状态(监测外周血中的中性粒细胞和血小板)；
- 骨髓储备(累积的化疗预处理，先前的放射治疗)；
- 在与其他细胞抑制剂联合治疗的范围内预期的骨髓抑制作用；
- 可以合并使用保肝、保护心脏以及预防呕吐等药物。